

FLORE DE L'ILE DE LESBOS, par **M. Paléologos CANDARGY.**

II. ESPÈCES PLUS OU MOINS RARES ET VARIÉTÉS NOUVELLES.

- Gymnogramme leptophylla* Desv. — In saxosis humidis. — RR.
- Cheilanthes Szovitzii* F. et M. — Regio montana. — RR.
- Nothochlæna Marantæ* L. — In saxosis. — R.
- Cystopteris fragilis* L. — Mons Olympos. — R.
- Asplenium Trichomanes* L. — Mont.
- A. lanceolatum* Huds. var. *obovatum* — Ad pagum Moria. — RR.
- A. Adiantum-nigrum* L. var. *acutum* Bory. — Montibus.
- Osmunda regalis* L. — Ad pagum Chydæra.
- Equisetum Telmateia* Ehrh. — In humidis regionis inferioris.
- E. limosum* L. — Ibidem.
- E. ramosum* Schl. β. **icosapleurum** (costis plus minus 20). — Ad Mitylenem.
- Juniperus Oxycedrus* L. — Regio montana. — RR.
- J. fætidissima* Willd. (= *J. Sabina* Sm.). — In colle Pagani ad Mitylenem.
- Pinus Pinea* L. — Ad Mesotopus culta.
- P. Laricio* Poir. — Ad Batusa in colle Chalicas et ad pedes montis Bordanas. — C.
- Ephedra nebrodensis* Trin. — Mons Lepetymnon et Geranios, 520-600 metr. Vaginis urceolatis breviter tubulosis inferne ventricosis, sœpe non nigris, superne bifidis vel omnino incisis.
- Zannichellia palustris* L. — In aquis Charamidis regionis inferioris Maleæ.
- Potamogeton natans* L. — In aquis Hydata dictis ad Ipios.
- Ruppia rostellata* Koch. — In salsuginosis littor. Euriaki Jeræ et Acothi Charamisque Maleæ nec non ad lacum Megali Limni.
- Zostera nana* Roth.
- Z. maritima* L. — RR.
- Telmatophace gibba* (L.) Schleid. — In stagnis Charamidis, Pachys Ammos, Sigrion, et ad Achyrona in fluv. Aspropotamos.
- Dracunculus vulgaris* Schott var. **crispus**. — In colle Anaphani ad Mitylenem. Spatha magna margine crispa!!.

Echinochloa Crus-galli P.-B.

Setaria glauca L.

Erianthus strictus Boiss. var. **lasiorrhachis**. — Paniculæ ramis rāmulis spicularum pedicellisque longe pilosis. Ad Messa (Kalloni).

E. Ravennæ P. de B. — In valle Ipios.

Chrysopogon Gryllus Trin. — Kalloni, Despotu Bryssis (in silva Peucōn). Amali.

Sorghum halepense Pers.

Andropogon hirtus L. — RR.

Phalaris cærulescens Desf. — Flosculo hermaphrodito glumis 3- aut 2-plo breviore. In collibus Anemomylos, Aimetet, Udja, etc. Ad Mitylenem (espèce nouvelle pour l'Asie). — C.

Crypsis aculeata Ait. — Ad Mitylenem. — C.

Heleochochloa alopecuroides Boiss. forma **ramosa**. — Culmis in orbem expansis ramosis, glumis glumellisque superne attenuatis obtusculis. Circa Mitylenem.

Phleum arenarium L. — Littus ad Nerutsica (Malea).

P. nodosum L. **forma** glumis apice saepe suboblique truncatis, aristis sublongioribus. — Ad Dip, Megali Limni.

Alopecurus agrestis L. — C. in Malea.

A. agrestis L. β . *tonsus* Blanche. — In Iera.

Stipa tortilis Desf. — In collibus, ad 500 metr. — C.

Milium vernale MB. β . *Montianum* Coss. — In regione montana Olympi. — C.

Agrostis verticillata Vill. — Hinc inde.

Antinoria insularis Parl. — Regio Olympiae 0-500 metr.

Holcus annuus Salzm. — RR. in colle Udja ad Mitylenem.

Ventenata subnervis Boiss. — In Udja et Plati.

V. subnervis Boiss. β . **nervosa**. — Indumento foliorum molli, lamina earum 2 1/2-5 mm. longa, glumis *distincte nervosis* sublævibus haud attenuato-aristatis sed *acutis*, inferiore 3-nervia angustiore, dimidia parte glumæ superioris 5-nerviæ longiore. Habitat in colle Tsicuria Maleæ regionis.

Phragmites isiacus Kth. — In aquis, loco Fabæ Larissæ dicto.

Lamareckia aurea Mönch. — Foliis glabris, in collibus ad Mitylenem.

Eragrostis poæoides. P. de B. (= *E. minor* Host.). — RR.

Briza minor L. — In planicie Jeræ, colle Udja.

Dactylis glomerata L., var. *hispanica* Boiss. — In collibus Tsicuria, Rocanæ reg. Maleæ.

Poa cæsia Sm. — In saxis montis Lepetymni 1000 metr.

Glyceria fluitans R. Br. — In lacu Megali-Limni.

Atropis festucæformis Cosson. — In halipedis Charamis Pamphyla Machæraque. — C.

Festuca arundinacea Schreb. β. *Fenas* Hackel. — In pinetis Peucôn dictis inter Despotu-Brysis et Megali-Limni.

Vulpia Myuros Auct. — Ad Mitylenem.

V. sciurooides Rehb. — In collibus Udja et Plati (reg. Malea) et in monte Palæocastron regionis Olympiæ.

Nardurus Poa Boiss. forma **aristata**. — In colle Tsicuria 280 metr.

Catapodium Salzmanni Cosson. — In oropedio montis Amali 460 m.

Bromus madritensis var. **urbicus**. — Foliis molliter pubescentibus, culmis superne pubescentibus, vaginis glabris, spiculis glabris, glumis et glumellis late membranaceis apice ad carinam scabriusculis, flosculis densis spiculis augustioribus, paniculæ pedicellis inferioribus ramosis. In urbe Mitylene.

B. rigidus Roth. — Ad Pamphyla Thermni et ejus littus, in colle Chalacas regionis Maleæ.

B. scoparius L. — α. forma spiculis pluribus compactis 1. minoribus, 2. longioribus. — C.

— β. forma **depauperata** spiculis 4-3-6 minoribus.

B. Alopecurus Poir. — Ad Mitylenem.

B. macrostachys Desf. — In Malea, culmis superne glabris vel brevissime pubescentibus. — C.

B. lanuginosus Poir. — In reg. Malea : valle Charamis, ad pagos Pamphyla Panajudaque; regione Olympiae : Karini, Megali-Limni. — C.

Brachypodium ramosum R. et Sch. — In saxosis collium Robica, Lacerda, Gaidaraniforos Maleæ.

Agropyrum littorale Boiss. — Littus Maleæ.

A. junceum (L.) P. de B. — Littus Kalloni, Xambelia, Pachys-Ammos, Hagios Stephanos.

Secale cereale L. — Spont. in valle Sigrion ubi vulgo ἀγριοσίκαλις et culta σήκαλις.

Triticum durum Desf. — Cultum. α. *glabrum*, spicis glabris. — β. *villosum*, spicis villosis.

Triticum turgidum L. cult. **α. vulgare**. — Cum glumis glumellisque glabris aristæ albæ, sed contrarie in sequentibus glumæ glumellæque semper pubescentes sunt.

- **β. bimense**. — Vulgo δυομηνίτης seu induratio bimensis Junio ad Julium. Characteribus varietatis *nigro-aristatae* sed aristis albis vel inferne basi nigris. Varietas induratione insignisque colitur in montibus Kryoscopos, Megala-Rachta ad montem Ordymnos dictum Lesbi occidentalis.
- **γ. nigro-aristatum**. — Vulgo μαυραγάνης ut varietas *Sparus* sed spica tenuior et longior. In Megala-Rachta ad monasterium Pytharion regionis Ordymniæ.
- **δ. Sparus**. — Vulgo σπάρος seu similis spica pisci σπάρος dicto. Glumæ glumellæque albæ; aristæ e basi ad medium usque nigræ. Spica ovato-oblonga ample turgido complanata piscis spari dicti ad instar. In campo Sigrion colitur.
- **ε. hirundineum**. — Vulgo χελιδονόσταρον, glumæ glumellæque nec non aristæ omnino atro-nigræ. In Kalloni et in Kalo-niro cultum.

T. vulgare Vill. **aristatum**, laxum, album. — Cult.

T. vulgare muticum, compactum, rufum (*T. sativum* DC.). — Cultum.

T. boeticum Boiss. — Spont. ad ecclesiam Hagios Stratonicos Maleæ. — R.

Aegilops caudata L. var. **parathera**. — Glumis spicularum lateralium 3-dentatis, dente medio mutico triangulari, lateralibus in aristas tenui-setaceas auctis. Ad Mitylenem. — RR.

E. comosa Sibth. et Smith. = Reg. Maleæ. — C.

Lolium perenne L. — In monte Oros Jeræ et colle Anemomylos ad urbem Mitylenem.

L. multiflorum Gaud. forma **mutica**. — Ad pagum Moria.

L. temulentum muticum Boiss. — Ad locum Karini reg. Olympiæ 100 metr. — RR.

Lepturus filiformis Trin. — Littus Sigrion. — RR.

Carex divulsa Good. — In campo Jeræ, ej. slev. Lygionas, ad pagos Thermni, Pamphyla.

C. illegitima Cesat. — In colle Maggana Larissæ, 220 metr.

C. Linkii Schk. — Reg. submont. et mont. in Karini, Flambro, Miribili, Provalma, ad pagum Asomati.

C. acuta Auct. — RR.

Carex serrulata Bir. **β. scabriuscula**. — Culmis superne scabriusculis. Ad littus Thermni, colle Udja.

- C. serrulata* Bir. γ. **brevibracteata**. — Culmis superne glabriusculis, bracteis spiculæ inferioris abbreviatis. In colle Liacas regionis Olympiæ.
- C. distans* L. — Humidis loci Evriaci dicti et in toto campo Jeræ. Colle Tsicuria in loco Areti ad pagum Mandamados.
- C. Hornschuchiana* Hoppe. — Stagnis Megali-Limni.
- Schœnus nigricans* L. — Ad fluv. Kurneli Maleæ; in pinetis Peucôn dictis ad locum Despotu-Brysis.
- Cladium Mariscus* R. Br. — In aquis Dip et Fabæ Larissæ.
- Isolepis tenuis* Presl. — In humidis Evriaki Jeræ, ad Mitylenem, ad pagum Gelia.
- Scirpus lacustris* L. — Megali-Limni.
- S. Tabernæmontani* Gmel. — Ad litt. Dip.
- Cyperus schœnoides* Griseb. — In aren. marit. Pachys Ammos reg. Ordynniæ.
- C. fuscus* L. — Malea.
- C. glaber* L. — Ad Mitylenem.
- C. badius* Desf. — Colle Adjem (Mitylene), etc.
- C. rotundus* L. — Ibidem.
- Luzula Forsteri* Sm. — Mons Olympos.
- Juncus bufonius* L. — Megali-Limni, Dip, Evriaci.
— var. **major**. — Caulibus longioribus, floribus solitariis vel 1-3 approximatis, in cymas laxas paniculam laxam formantibus dispositis; perigonii phyllis membranaceo marginatis inæqualibus. Capsula perigonio longiore. Larissa, Megali-Limni, Udja.
- J. bufonius* L. var. *fasciculatus* Koch. — In fluv. Tinegias.
- J. pygmæus* Thuill. var. **brachycarpus**. — Differt a typo capitulo inferiore pedicellato, capsula perigonii phyllis paulo breviore. — Megali-Limni.
- J. lamprocarpus* Ehrh. — Ad pagos Asomati et Mandamados.
- J. effusus* L. — Hinc inde.
- J. conglomeratus* L. — Ibidem.
- J. Gerardi* Lois. — In stagnis exsiccati Charamis.
— var. *condensatus* Boiss. — Ibidem et in Kalloni.
- Merendera sobolifera* C. A. Mey. — Reg. montana districti Plomari dicti. (*A suivre.*)